

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

| Impfung                           | Alter in Wochen | Alter in Monaten |                 |    |       |                    | Alter in Jahren |     |      |                         |                 |                 |                |  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----|-------|--------------------|-----------------|-----|------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
|                                   | 6               | 2                | 3               | 4  | 11–14 | 15–23              | 2–4             | 5–6 | 9–14 | 15–17                   | ab 18           | ab 60           |                |  |
| Tetanus                           |                 | G1               | G2              | G3 | G4    | N                  | N               | A1  | A2   | A (ggf. N) <sup>d</sup> |                 |                 |                |  |
| Diphtherie                        |                 | G1               | G2              | G3 | G4    | N                  | N               | A1  | A2   | A (ggf. N) <sup>d</sup> |                 |                 |                |  |
| Pertussis                         |                 | G1               | G2              | G3 | G4    | N                  | N               | A1  | A2   | A (ggf. N) <sup>d</sup> |                 |                 |                |  |
| Hib<br><i>H. influenzae</i> Typ b |                 | G1               | G2 <sup>b</sup> | G3 | G4    | N                  | N               |     |      |                         |                 |                 |                |  |
| Poliomyelitis                     |                 | G1               | G2 <sup>b</sup> | G3 | G4    | N                  | N               |     | A1   | ggf. N                  |                 |                 |                |  |
| Hepatitis B                       |                 | G1               | G2 <sup>b</sup> | G3 | G4    | N                  | N               |     |      |                         |                 |                 |                |  |
| Pneumokokken                      |                 | G1               | G2              | G3 | G4    | N                  |                 |     |      |                         |                 | S <sup>f</sup>  |                |  |
| Rotaviren                         | G1 <sup>a</sup> | G2               | (G3)            |    |       |                    |                 |     |      |                         |                 |                 |                |  |
| Meningokokken C                   |                 |                  |                 |    |       | G1 (ab 12 Monaten) |                 | N   |      |                         |                 |                 |                |  |
| Masern                            |                 |                  |                 |    |       | G1                 | G2              | N   |      |                         | S <sup>e</sup>  |                 |                |  |
| Mumps, Röteln                     |                 |                  |                 |    |       | G1                 | G2              | N   |      |                         |                 |                 |                |  |
| Varizellen                        |                 |                  |                 |    |       | G1                 | G2              | N   |      |                         |                 |                 |                |  |
| Influenza                         |                 |                  |                 |    |       |                    |                 |     |      |                         | S<br>(jährlich) |                 |                |  |
| HPV<br>Humane Papillomviren       |                 |                  |                 |    |       |                    |                 |     |      |                         | G1 <sup>c</sup> | G2 <sup>c</sup> | N <sup>c</sup> |  |

## Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfsreihe)

- a Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- b Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- c Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) mit 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten, bei Nachholimpfung und Vervollständigung der Impfsreihe im Alter > 13 bzw. > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 6 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- d Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- e Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, mit einem MMR-Impfstoff
- f Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff